

Příbalová informace – Informace pro uživatele

ACYCLOSTAD GALMED

krém
acyclovirum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však přípravek Acyclostad Galmed musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 10 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

- 1) Co je přípravek Acyclostad Galmed a k čemu se používá
- 2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acyclostad Galmed používat
- 3) Jak se přípravek Acyclostad Galmed používá
- 4) Možné nežádoucí účinky
- 5) Jak přípravek Acyclostad Galmed uchovávat
- 6) Další informace

1.) Co je Acyclostad Galmed a k čemu se používá

Přípravek Acyclostad Galmed léčí virové infekce (patří mezi antivirotika).

Léčba přípravkem Acyclostad Galmed způsobuje úlevu od bolesti a svědění při často se opakujících infekčních oparech rtů (opakující se herpes labialis – puchýřky na rtech a okolo nich).

2.) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Acyclostad Galmed používat?

Nepoužívejte přípravek:

- při známé přecitlivělosti na aciklovir nebo jakoukoli jinou látku obsaženou v přípravku.
- na sliznice (např. dutiny ústní) a do očí, aby nedošlo k místnímu podráždění.

Zvláštní opatření při použití přípravku Acyclostad Galmed je zapotřebí:

Pokud máte výrazně oslabený imunitní systém, smí být přípravek Acyclostad Galmed používán pouze po poradě s lékařem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné ovlivnění přípravku Acyclostad Galmed s jinými léky nebyly dosud zaznamenány.

Těhotenství a kojení:

Zptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.

Těhotenství:

Omezené zkušenosti s užíváním acikloviru v těhotenství nenaznačují nežádoucí účinky acikloviru na těhotenství, zdraví plodu a novorozence. Přípravek smí být v těhotenství užit pouze po pečlivém zvážení rizika a přínosu léčby.

Kojení:

Při aplikaci na zdravou pokožku je vstřebané množství acikloviru zanedbatelné. Při použití přípravku kojící matkou je u kojence vstřebané množství acikloviru malé. Pokud při používání přípravku kojíte, nesmí kojenec přijít do kontaktu s ošetřenými plochami pokožky.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:

Dosud není znám žádný účinek přípravku na schopnost řídit a ovládat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Acyclostad Galmed:

Cetylalkohol může způsobit lokální podráždění kůže (např. kontaktní dermatitidu).

Propylenglykol může způsobit lokální podráždění kůže.

3.) Jak se přípravek Acyclostad Galmed používá?

Vždy pečlivě dodržujte pokyny v této informaci. Pokud si nejste něčím jisti, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklé dávkování:

Tenkou vrstvou krému nanášejte na postiženou pokožku pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech během dne.

Jak se Acyclostad Galmed užívá?

Krém nanášejte bavlněným tampónem. Dostatečné množství krému musí pokrýt celou zasaženou oblast kůže (pupínky, otok, zčervenání) i její okolí.

Pokud krém nanášíte rukou, ruce musí být umyty před i po aplikaci, aby se zabránilo superinfekci poškozené kůže (např. bakteriemi) a/nebo přenosu viru na nová dosud neinfikovaná místa kůže či sliznic.

Zvláštní upozornění

K dosažení co nejlepšího výsledku by mělo být léčení zahájeno co nejdříve po objevení se prvních projevů infekce (pálení, svědění, pnutí a zčervenání). Antivirová terapie Acyclostad Galmed je neúčinná poté, co se na lézích začnou tvořit strupy.

Délka léčby

Léčba obvykle trvá pět dní, v individuálních případech by měla pokračovat, dokud se puchýřky nezačnou hojit. Doba léčení však nemá být delší než deset dní.

Pokud máte pocit, že přípravek Acyclostad Galmed působí příliš silně nebo slabě, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Co byste měli dělat, pokud zapomenete krém použít?

Pokračujte dál ve stejné léčbě. Nenanášejte krém častěji ani ve větších vrstvách a pokračujte v léčbě v obvyklých časových intervalech.

Co byste měli mít na paměti, pokud přerušíte nebo předčasně ukončíte léčbu přípravkem Acyclostad Galmed?

Aby byla léčba úspěšná, přípravek by měl být užíván po dostatečně dlouhou dobu (viz výše).

Pokud máte další otázky k užívání tohoto přípravku, zeptejte se lékárníka.

4.) Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Acyclostad Galmed nežádoucí účinky, ačkoli se neprojeví u každého.

K rozdělení nežádoucích účinků byla použita četnost jejich výskytu:

Velmi časté	vyskytují se nejméně u 1 pacienta z 10
Časté	vyskytují se nejméně u 1 pacienta ze 100, ale u méně než 1 pacienta z 10
Méně časté	vyskytují nejméně u 1 pacienta z 1 000, ale u méně než 1 pacienta ze 100
Vzácné	vyskytují nejméně u 1 pacienta z 10 000, ale u méně než 1 pacienta z 1 000
Velmi vzácné	vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10 000
Neznámé:	četnost nelze z dostupných údajů odhadnout

Poruchy kůže a podkožní tkáň

Méně časté: zarudnutí, suchá a olupující se kůže po ošetření krémem

Vzácné: alergická kožní reakce po aplikaci (kontaktní dermatitida). V případech, kdy byl proveden test citlivosti se ukázalo, že příčinou přecitlivělosti byly většinou pomocné látky, ne léčivá látka aciklovir. Kontaktní dermatitida se může projevit těžším průběhem výše zmíněných nežádoucích účinků a/nebo rozšířením i na neošetřená místa pokožky. V tomto případě, prosím, informujte lékaře.

Neznámé: Po aplikaci se může na ošetřené pokožce vyskytnout přechodné píchání nebo pálení.

Pokud se u Vás některý z vyjmenovaných nežádoucích účinků objeví v závažné míře, nebo pokud zpozorujete jiný nežádoucí účinek, v této informaci neuvedený, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.

5. Jak uchovávat přípravek Acyclostad Galmed

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na skládačce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchování.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6.) Další informace

Co přípravek Acyclostad Galmed obsahuje

Léčivou látkou je aciklovir

1 g krému obsahuje aciclovirum 50 mg

Pomocné látky jsou:

Dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda

Jak přípravek Acyclostad Galmed vypadá a co obsahuje toto balení

Acyclostad Galmed je bílý homogenní krém

Velikost balení: 5 g krému

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

5.5.2010