

COLDREX

Popis:

Coldrex Pastilky s příchutí citronu s medem nebo ostružina jsou vhodným lékem při bolestech v krku.

Pastilky působí trojím účinkem:

- * odstraňují bolest (lokální anestetikum)
- * ničí bakterie (antibakteriální složka)
- * tlumí dráždění v krku a příjemně chladí

Přípravek lze užívat současně s antibiotiky, mohou jej užívat i diabetici. Je vhodný pro děti od 7 let.

Příbalová informace - VP

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Coldrex proti bolesti v krku **citron s medem**

Coldrex proti bolesti v krku **ostružina**

Pastilky

Držitel rozhodnutí o registraci:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, GlaxoSmithKline Export Ltd., Brentford, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce: Ernest Jackson & Co. Ltd., Crediton, Devon, Velká Británie

Složení:

Léčivé látky: 1 pastilka obsahuje Hexylresorcinolum 2,5 mg, Benzalkonii chloridi solutio 500 g/l 1,2 mg.

Pomocné látky:

Coldrex proti bolesti v krku **citron s medem:**

levomentol, citronové aroma, tekuté medové aroma, propylenglykol, karamelové barvivo, beta-karoten, zrněný cukr, tekutá glukosa

Coldrex proti bolesti v krku **ostružina:**

levomentol, ostružinové aroma, propylenglykol, monohydrát kyseliny citronové, ponceau HR, brilantní čerň BN, zrněný cukr, tekutá glukosa

Indikační skupina: Otorhinolaryngologika. Antiseptika.

Charakteristika:

Coldrex proti bolesti v krku obsahuje hexylresorcinol, anestetikum (odstraňuje bolest), které má současně antibakteriální účinek (ničí bakterie). Dále obsahuje benzalkonium chlorid, který působí rovněž antibakteriálně.

Indikace:

Coldrex proti bolesti v krku je určen k odstranění bolestí v krku různého původu, zejména bolestí provázejících zánět hrdla (faryngitis). Je určen pro dospělé a děti od 7 let.

Kontraindikace:

Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na léčivé látky nebo další složky přípravku. Nesmí ho užívat pacienti s poruchou metabolismu glukosy nebo sacharosy nebo nesnášenlivostí fruktosy. Přípravek se nepodává dětem do 7 let.

Nežádoucí účinky:

Účinné látky jsou dobře snášeny při doporučeném dávkování a způsobu užití. Nežádoucí účinky nejsou popsány, vzácně se může objevit přecitlivělost na některou složku přípravku projevující se pálením v krku nebo kožní vyrážkou.

Interakce:

Závažné vzájemné reakce léků s tímto přípravkem nejsou známy. Přípravek lze užívat současně s antibiotiky.

Dávkování a způsob užití:

Dospělí a děti od 12 let: 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby. Neužívejte více než 8 pastilek za 24 hodin. Děti od 7 do 12 let: 1 pastilka se pomalu rozpustí v ústech každé 3 hodiny podle potřeby. Nepodávejte více než 4 pastilky za 24 hodin. Dětem do 7 let přípravek nepodávejte. V případě, že příznaky onemocnění přetrvávají déle než 5 dnů u dospělých osob a 3 dny u dětí, poraďte se o další léčbě s lékařem. Nepřekračujte doporučené dávkování.

Upozornění:

Během těhotenství a v době kojení je vhodné se předem poradit s lékařem o užívání přípravku. Diabetici mohou užívat přípravek po poradě s lékařem. Při předávkování nebo náhodném požití léku dítětem se poraďte s lékařem.

Přípravek COLDREX PROTI BOLESTI V KRKU OSTRUZINA obsahuje azobarviva (brilantní čern, ponceau), která mohou způsobit alergickou reakci.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C.