

# TERBISTAD 1% KRÉM 1X7.5GM Krém

## Co obsahuje Váš lék?

Co přípravek Terbistad 1% krém obsahuje: 1 g krému obsahuje 10 mg terbinafini hydrochloridum.

## Další látky obsažené v léku

Hydroxid sodný (E524), benzylalkohol, sorbitan-stearát (E491), cetyl-palmitát, cetylalkohol, cetylstearylalkohol, polysorbát 60 (E435), izopropyl-myristát, čištěná voda.

## Charakteristika

Co je přípravek Terbistad 1% krém a k čemu se používá. Terbistad 1% krém patří do skupiny antifungálních přípravků. Terbistad 1% krém je účinný proti určitým druhům kvasinek a kožních houbových onemocnění, z nichž je nejznámější atletická noha (tinea pedis). Viz rovněž bod "Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá", kde naleznete více informací o dalších houbových infekcích.

## Kdy se lék používá?

Tento přípravek se užívá k léčbě houbových a kvasinkových infekcí kůže.

## Kdy byste neměli lék užívat

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Terbistad 1% krém používat. Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém: - Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na terbinafin nebo na kteroukoliv další složku přípravku Terbistad 1% krém. (Viz "Pomocné látky"). Můžete pozorovat známky přecitlivělosti, například červené skvrny a boule na kůži či svědění.

## Nežádoucí účinky

Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Terbistad 1% krém nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V místě aplikace se může objevit zčervenání, kožní vyrážka, svědění nebo pocit brnění. Vzácně se vyskytly alergické reakce projevující se jako svědění, vyrážka, puchýřková vyrážka a kopřivka. Jestliže silně trpíte uvedenými nežádoucími účinky, je vhodné se obrátit na svého lékaře. Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

## Jak mohou jiné léky ovlivnit léčbu?

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky Neexistují žádné důkazy o tom, že Terbistad 1% krém má účinek na jiné přípravky. Prosím, informujte svého lékárníka o všech lécích,

kteří užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

## **Těhotenství a kojení**

Těhotenství Nesmíte požívat přípravek Terbistad 1% krém pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete. Pokud otěhotníte během požívání přípravku, informujte o tom svého lékaře. Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku. Kojení Protože terbinafin přechází do mateřského mléka, nesmíte přípravek Terbistad 1% krém během kojení používat. Porad'te se se svým lékařem nebo lékárníkem před užitím jakéhokoliv léku.

## **Dávkování**

Jak se přípravek Terbistad 1% krém používá. Dospělí a dospívající (nad 12 let): Trvání a četnost léčby - Atletická noha (tinea pedis): jednou denně po dobu 1 týdne. Příznaky, které lze zahrnout pod označení atletická noha, jsou svědění, zarudnutí a odlupování kůže mezi prsty u nohou a na chodidlech. Někdy se také objevují trhliny (zejména mezi prsty u nohou) a mohou vzniknout i mokvající puchýře. Atletická noha obvykle vydává nepříjemný zápach. - Ostatní dermatofytózy (tinea corporis a cruris): jednou denně po dobu 1 týdne. Tinea je tvořena pomalu rostoucími, svědivými, červenými a odlupujícími se skvrnami kruhového tvaru, které se mohou rozšířit po celém těle. - Kožní kandidóza (onemocnění způsobené kvasinkami): jednou denně po dobu 1-2 týdnů. Candida je druhem kvasinek, který může za určitých okolností způsobovat infekci kůže. Kožní abnormality se často nacházejí v teplých, vlhkých místech, jako jsou slabiny nebo pod prsy. Symptomy zahrnují svědění, zčervenání a odlupování. - Pityriáza (Pityriasis versicolor): jednou až dvakrát denně po dobu 2 týdnů. Kvasinkou, která způsobuje pityriasis versicolor, je Malassezia furfur. U této kvasinky se infekce vyskytuje na ramenou, v horní části trupu a horních částech paží. Příznaky zahrnují slabé svědění a skvrny se slabým odlupováním. U silně opálených lidí jsou skvrny obvykle světlejší než zbývající pokožka, zatímco u lidí, kteří byli působení slunce vystaveni málo nebo vůbec, jsou skvrny obvykle světle hnědé. Zlepšení příznaků obvykle nastává po několika dnech. Nepravidelné používání nebo předčasné zastavení používání krému zvyšuje riziko opakovaného výskytu příznaků. Jestliže se po 1-2 týdnech neobjeví žádné zlepšení, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Starší pacienti: Nejsou žádné důkazy o tom, že starší pacienti vyžadují odlišné dávkování nebo trpí jinými nežádoucími účinky než mladší pacienti. Děti: Zkušenosti s podáváním přípravku Terbistad 1% krém na kůži u dětí mladších 12 let jsou omezené, použití tohoto léčivého přípravku v této věkové skupině se proto nedoporučuje. V případě kontaktu krému s okem, oko vypláchněte pod tekoucí vodou. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Terbistad 1% krém: Pokračujte v léčbě bez toho, že byste nanášeli přípravek Terbistad 1% krém vícekrát nebo jej použili ve větším množství než obvykle. Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Terbistad 1% krém. Jestliže jste náhle přestal(a) používat přípravek Terbistad 1% krém, původní příznaky se mohou objevit znovu. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **Použití**

Způsob použití: na kůži. Otvor tuby je opatřen hliníkovým uzávěrem. Uzávěr můžete prolomit obráceným vrškem tuby tím, že na něj vyvinete lehký tlak. Před použitím krému musí být pokožka pečlivě omytá a vysušená. Naneste tenkou vrstvu krému na zanícenou pokožku a menší množství i okolo. Krém jemně vetřete do pokožky. V případě, že se zánět nachází v

kožním záhybu (pod prsy, mezi prsty na noze či ruce, ve slabinách nebo mezi hýžděmi) lze kůži pokrýt sterilní gázou, zejména na noc. Po vetření si omyjte ruce, pokud nejde o léčbu vašich rukou.

### **Předávkování**

Jestliže jste použil(a) více přípravku Terbistad 1% krém, než jste měl(a): Pokud jste použili příliš velké množství přípravku Terbistad 1% krém, nezpůsobí to žádnou újmu, ale v případě nejistoty se obraťte na svého lékárníka. Pokud někdo, např. dítě, polkne krém, mohou se vyskytnout stejné nežádoucí účinky jako při předávkování terbinafinem v tabletách (např. bolest hlavy, nevolnost, bolest břicha a závratě). V tomto případě informujte lékaře.

### **Upozornění**

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku na řízení a ovládání strojů.

### **Uchovávání**

Jak přípravek Terbistad 1% krém uchovávat. Uchovávejte v původním obalu. Chraňte před mrazem. Po použití tubu dobře uzavřete.

### **Varování**

Uchovávejte přípravek Terbistad 1% krém mimo dosah a dohled dětí. Nepoužívejte přípravek Terbistad 1% krém po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na skládačce a tubě. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

### **Balení**

Co obsahuje toto balení: Obsah hliníkové tuby s polyetylenovým závitovým (šroubovacím) uzávěrem je 7,5, 15 a 30 gramů.

### **Výrobce**

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, SRN. Gedeon Richter Ltd., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko. Centrafarm Services B.V., Neuwe Donk 9, NL-4879 Etten-Leur, Nizozemsko. Stada Arzneimittel GmbH, Muthgasse 36/2, A-1190 Vídeň, Rakousko.

### **Držitel registrace**

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, SRN.

### **Zdroj informací**

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vibel, SRN.