

Magnesii lactici galmed 0,5 tbl.



Doplněk stravy

Složení:

Účinná látka: Magnesii laktas dihydricus (dihydrát magnesium-laktátu) 0,500 g v 1 tabletě obsahuje 51 mg hořčíku

Pomocné látky: kukuřičný škrob, laktóza, předželatinový škrob, talek, stearan hořečnatý, polyvinylpyrolidon

Indikační skupina:

Minerální přípravek

Charakteristika:

Přípravek doplňuje sníženou hladinu hořčíku v organismu. Hořčík má svou nezastupitelnou úlohu pro bezchybnou funkci nervového systému, kde reguluje přenos vzruchů k nervům a ovlivňuje tak nervosvalovou dráždivost a svalovou kontrakci. Jeho nedostatek vede ke křečovým stavům. Dále funguje jako katalyzátor četných chemických reakcí v našem organismu, reguluje propustnost buněčných membrán, má důležitou úlohu při transformaci krevního cukru na energii. Hořčík zpevňuje kostní tkáň, pomáhá udržovat tvrdou zubní sklovinu a odolnost proti zubní kazivosti. Potřeba hořčíku také stoupá v těhotenství.

Dávkování a způsob použití:

Dospělí 2–3 tablety denně, děti od 3 let ½–1 tableta denně.

Upozornění

Není určeno pro děti do 3 let. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Přípravek nepoužívejte jako náhradu pestré stravy. Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávání:

Přípravek se uchovává na suchém místě při teplotě do 25 °C. Ukládat mimo dosah dětí!

Balení: 50 tableť v blistru.

Hmotnost obsahu: 40,1 g

Výrobce: pro Galmed a.s. vyrábí Biomedica s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, ČR, www.galmed.cz

Magnesii lactici galmed 0,5 tbl.



Výživový doplnok

Zloženie:

Účinná látka: Magnesii laktas dihydricus (dihydrát magnezium-laktátu) 0,500 g v 1 tablete obsahuje 51 mg horčíka

Pomocné látky: kukuričný škrob, laktóza, predželatinový škrob, talkum, stearan horečnatý, polyvinylpyrrolidon

Indikačná skupina:

Minerálny prípravok

Charakteristika:

Prípravok dopĺňa zníženú hladinu horčíka v organizme. Horčík má nezastupiteľnú úlohu pri bezchybnej funkcii nervového systému, kde reguluje prenos vzruchov k nervom a ovplyvňuje tak nervosvalovú dráždivosť a svalovú kontrakciu. Jeho nedostatok vedie ku kŕčovým stavom. Ďalej funguje aj ako katalyzátor mnohých chemických reakcií v našom organizme, reguluje priepustnosť bunecných membrán, má dôležitú úlohu pri transformácii krvného cukru na energiu. Horčík spevňuje kostné tkanivo, pomáha udržiavať tvrdú zubnú sklovinu a odolnosť proti zubnému kazu. Potreba horčíka taktiež stúpa v tehotenstve.

Dávkovanie a spôsob použitia:

Dospelí 2–3 tablety denne, deti od 3 rokov ½–1 tableta denne.

Upozornenie

Nie je určené pre deti do 3 rokov. Neprekračujte doporučené denné dávkovanie. Prípravok nepoužívajte ako náhradu pestrej stravy. Prípravok nesmie byť užívaný po uplynutí času použiteľnosti vyznačeného na obale.

Uchovávanie:

Prípravok sa uchováva na suchom mieste pri teplote do 25 °C. Ukládať mimo dosah detí!

Balenie: 50 tabliet v blistry.

Hmotnosť obsahu: 40,1 g

Výrobca:

pre Galmed a.s. vyrába Biomedica s r.o., Pekařská 8, 155 00 Praha 5, ČR,
www.galmed.cz
