

Informace pro použití, čtěte pozorně!

Název: **OCUflash[®]**

Forma: oční kapky, roztok

Výrobce: UNIMED PHARMA s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení: Natrii chloridum (chlorid sodný) 7 mg v 1 ml
pomocné látky: benzalkonii chloridum (benzalkóniumchlorid) 0,04 mg v 1 ml (0,004%), dinatrii edetas dihydricus (dihydrát edetanu disodného), kalii chloridum (chlorid draselný), magnesi chloridum (chlorid horečnatý), polysorbatum 80 (polysorbát 80), tinctura euphrasiae (tinktura světlíku lékařského), natrii tetraboras (tetraboritan sodný), natrii hydroxidum (hydroxid sodný), aqua ad injectabilia (voda na injekce).

Charakteristika: OCUflash[®] je speciální oční (isotonický, pufrovaný) roztok s přídatkem výtažku ze světlíku lékařského. Je určen ke vkapávání do očí nebo k výplachům očí. Výtažek ze světlíku lékařského působí v oku protizánětlivě, dezinfekčně a adstringentně (svíravě). Tyto vlastnosti světlíku lékařského se již dlouhodobě využívají ke zklidnění očí, k prevenci a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů víček a spojivek.

Použití: OCUflash[®] je ideální výplachový roztok pro odstranění čehokoliv cizího z oka. Bez porady s lékařem může být použit jak k jednoduchému krátkodobému výplachu, tak i ke vkapávání do očí nebo k obkladům víček. Přípravek se používá při nepříjemných pocitech v oku jako je pálení, řezání, svědění a pocit cizího tělesa v oku. V praxi je OCUflash[®] ideální použít například:

1. k vymývání oka při odstraňování cizích tělísek, prachu a chlórované vody z oka,
2. jako první pomoc po poleptání očí kyselinou nebo zásadou (vápnem, maltou)
3. ke zklidnění očí při lehčích, neinfekčních formách zánětů spojivek a zánětů okrajů víček,
4. k odstranění krust a k vymývání hleny a hnisu z oka před aplikací antibiotik u hnisavých zánětů očí
5. k odstraňování šupinek z okrajů víček při vleklých zánětech víčkových okrajů
6. k výplachům oka po nošení kontaktních čoček (zvláště těch tvrdých)
7. v praxi očního lékaře k výplachům oka po aplanační tonometrii nebo gonioskopii
8. k odstraňování kosmetických přípravků z okolí oka, víček a řas

OCUflash[®] mohou požívat dospělí, děti i mladiství. Vzhledem k bezpečnosti přípravku je možno jej podávat i novorozencům, kojencům, těhotným ženám a kojícím matkám.

Kontraindikace: OCUflash[®] nesmí být používán při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku.

Nežádoucí účinky: OCUflash[®] je velmi dobře snášen. U citlivých jedinců se bezprostředně po aplikaci může vyskytnout přechodné mírné pálení.

Upozornění: OCUflash[®] neovlivňuje pozornost při řízení motorových vozidel, obsluze strojů a práci ve výškách, které vyžadují zvýšenou pozornost. Při aplikaci do spojivkového vaku však může ojediněle přechodně dojít k rozmazanému vidění. Proto výše jmenované činnosti, vyžadující zvýšenou pozornost, je možno vykonávat až po odeznění tohoto přechodného účinku. Při předávkování či náhodném požití přípravku dítětem je léčba symptomatická.

Pacient nesmí současně s používáním přípravku OCUflash[®] nosit měkké kontaktní čočky. Po dobu používání přípravku není vhodné nosit ani tvrdé kontaktní čočky. Nelze-li jinak, je vhodné, aby si před aplikací přípravku OCUflash[®] pacient kontaktní čočky z oka vyjmul a nasadil si je zpět nejdříve 20 minut po nakapání přípravku do oka. Pokud jsou současně užívány i jiné oční kapky či masti, je vhodné je aplikovat do oka nejdříve za 5 minut po aplikaci přípravku OCUflash[®].

Interakce: Interakce nejsou dosud známy.

Dávkování: Ke zklidnění očí a k podpůrné léčbě neinfekčních zánětů spojivek a víček vkapáváme do dolního spojivkového vaku 1-2 kapky 1-4x denně. Při výplachu čehokoliv cizího z oka aplikujeme roztok až do doby odstranění cizorodé látky či cizích tělísek, popřípadě do zmírnění obtíží.

Návod k použití: Po odšroubování uzávěru lahvičky je *OCUflash*[®] připraven k použití. Pacient mírně zakloní hlavu, obrátí lahvičku dnem vzhůru a stlačením lahvičky z plastu vkápne do dolního spojivkového vaku požadovaný počet kapek. Množství aplikovaného roztoku závisí na způsobu použití. Chceme-li oko vypláchnout, stlačíme lahvičku tak, až dosáhneme, že vyteče požadované množství roztoku. Při zánětech víček je možné roztok použít i k obkladům. Při jakékoliv manipulaci dbáme na to, aby se kapátko lahvičky nedotklo oka, víček nebo řas. Tím bráníme znečištění a kontaminaci přípravku. Po použití uzávěr kapátka pevně zašroubujeme a lahvičku uchováváme ve svislé poloze.

Varování: Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní. Po nakapání přípravku do oka lahvičku ihned uzavřete. Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 2x10ml

Uchovávání: Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. Neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem.

Datum poslední revize textu: listopad 2005