

Informace pro použití, čtěte pozorně!

SENSIVIT[®]

Oční kapky, roztok

Výrobce:

UNIMED PHARMA s.r.o., Bratislava, Slovenská republika

Složení:

Carmellosum natricum (karmelosa, sodná sůl) 3mg v 1 ml roztoku.

Pomocné látky: Retinoli palmitas (Vitamin A), Alfa tocopheroli acetat (α -tokoferol-acetát – Vitamin E), Benzalkonii chloridum (benzalkonium-chlorid), Natrii chloridum (chlorid sodný), Natrii tetraboras (tetraboritan sodný, dekahydrát), Polysorbatum 80 (polysorbát 80), Macrogolglyceroli ricinoleas (glyceromakrogol-ricinoleát), Dinatrii edetas dihydricus (edetan disodný, dihydrát), Aqua ad iniectabilia (voda pro injekci).

Indikační skupina: oční roztok určený k zvlhčení oka

Charakteristika: SENSIVIT[®] je roztok, který slouží ke stabilizaci všech tří vrstev slz (slzného filmu) na povrchu oka. Slouží jako náhrada slz. Vytváří na povrchu rohovky a spojivky dočasný ochranný film. SENSIVIT[®] obsahuje sodnou sůl karmelózy. Ta stabilizuje vodní složku slzného filmu. SENSIVIT[®] obsahuje dále vitamín A. Ten posiluje tvorbu vnitřní, hlenovité vrstvy slzného filmu. Spolu s vitamínem E zlepšuje výživu rohovky a spojivky. Látky obsažené v přípravku posilují též vnější (lipidovou) složku slzného filmu. Tenká vrstva slz na povrchu oka je tak unikátně posílena, případně nahrazena, ve všech třech svých vrstvách. SENSIVIT[®] působí proti rychlému osychání povrchu oka. Výrazně zlepšuje ochranný efekt slz. Bezprostředně po nakapání vede k úlevě od nepříjemných pocitů v očích.

Použití: SENSIVIT[®] se používá k léčbě všech forem syndromu suchého oka a dále u všech stavů, vyžadujících vytvoření nebo posílení ochranného vlhkého filmu na rohovce a spojivce oka.

Kontraindikace: SENSIVIT[®] se nesmí používat při precitlivělosti na účinnou látku, nebo na některou pomocnou látku přípravku. Přípravek se nesmí podávat těhotným ženám a kojícím matkám. SENSIVIT[®] není vhodný pro děti do dvou let věku.

Nežádoucí účinky: Přípravek je velmi dobře snášen. Zřídka se bezprostředně po nakapání do oka může vyskytnout přechodné mírné pálení. Taktéž může dojít k alergické reakci.

Případný výskyt těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí hlase svému lékaři.

Interakce: V případě současného používání jiných očních kapek je potřebné aplikovat SENSIVIT[®] jako poslední. A to minimálně 5 minut po předchozí aplikaci jiných očních kapek. Váš lékař by měl být informován o všech lécích, které v současnosti užíváte. Popřípadě které jste donedávna užívali anebo začnete užívat. To platí o jak lécích na lékařský předpis, tak i bez něho. Jestliže užíváte i jiné oční přípravky, poraďte se o vhodnosti jejich současného používání se svým očním lékařem.

Dávkování a způsob podávání: Jestliže lékař neurčí jinak, aplikuje se obvykle do spojivkového vaku oka 1 kapka 1x až 3x denně. U dětí určí dávkování lékař individuálně. Přípravek mohou požívat dospělí, mladiství a děti od 2 let věku.

Upozornění: Těsně po aplikaci přípravku do oka se může objevit neostré vidění. Nedoporučuje se proto 20 minut po aplikaci přípravku řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje nebo pracovat ve výšce. Současně s používáním přípravku nelze nosit měkké kontaktní čočky. Tvrdé kontaktní čočky mají být před nakapáním vyjmuty a mohou být znovu nasazeny za 20 minut po nakapání. Při předepsaném dávkování je předávkování prakticky vyloučené. Při náhodném požití přípravku dítětem je léčba symptomatická.

Varování: Přípravek se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření lahvičky je 28 dní.
Po nakapání přípravku do oka lahvičku ihned uzavřete.
Přípravek musí být uchováván mimo dosah a dohled dětí.

Balení: 1 × 10 ml

Uchování: Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C. Neuchovávejte v chladu, chraňte před mrazem. Přípravek musí být uschováván mimo dosah dětí.

Datum poslední revize: 18.1.2007