

Biotussil 100ml

Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina V11), takže doporučujeme pečlivé přečtení příbalové informace.

Složení

Léčivé látky ve 100 g přípravku: Herbarum extractum pro Biotussil 97,80 g (ex Gentianae radix 0,20 g, Primulae flos 1,50 g, Plantaginis folium 1,50 g, Thymi herba 1,50 g, Liquiritiae radix 1,50 g, Sambuci flos 1,50 g) extrahováno ethanolem 23% (m/m), Foeniculi amari fructus etheroleum 0,05 g, Anisi stellati etheroleum 0,05 g

Pomocné látky: glycerol 85%, monohydrát sodné soli sacharinu.

1 ml = 23 kapek

Indikační skupina

Fytofarmakum - expektorans, sekretolytikum.

Charakteristika

Směs rostlinných lihových extraktů se sekretolytickým a antiseptickým účinkem.

Indikace

Pomocný lék při akutních a chronických onemocněních dýchacích cest včetně rýmy a zánětů vedlejších nosních dutin. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a děti od dvou let věku.

Kontraindikace

Přecitlivělost (alergie) na některou ze složek přípravku. Závažné srdečně-cévní choroby (zejména vysoký krevní tlak či poruchy srdečního rytmu), snížená hladina draslíku v krvi, těžké poruchy jater a ledvin, epilepsie, alkoholismus, těžké poruchy mozkových funkcí.

Během těhotenství a kojení není přípravek v doporučeném dávkování běžně kontraindikován, o jeho užívání v tomto období se však poraďte se svým lékařem. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci vyskytnou teprve během podávání, informujte o tom svého lékaře.

Nežádoucí účinky

Možnost vyvolání alergické reakce, případně i závažného typu.

Nežádoucí účinky přípravku nejsou známy ani při dlouhodobém používání. Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí nebo nových obtíží se poraďte s lékařem.

Interakce

Vzhledem k možným interakcím s některými dalšími léčivými přípravky informujte svého ošetřujícího lékaře o tom, že užíváte Biotussil. Jde zejména o léky upravující krevní srážlivost (warfarin), k posílení srdeční činnosti (digoxin) či úpravě poruch srdečního rytmu

(antiarytmika), močopudné léky (diuretika), některé léky proti depresím (antidepresiva) a epilepsii (antiepileptika), kyselinu acetylsalicylovou (lék při horečkách či bolestech) a kortikoidy včetně tabletové antikoncepce.

Při zakoupení jiných volně prodejných léčiv či doplňků stravy se poraďte s lékárníkem. Některé složky, zejména lékořice, mohou být obsaženy ve větší míře i v potravinách či doplňcích stravy, takže by mohlo dojít k nežádoucímu zvýšení jejich příjmu s možnými následnými nepříznivými dopady na zdravotní stav uživatele.

Dávkování a způsob použití

Pokud lékař neurčí jinak, doporučují se tyto dávky

Dospělí 3 x denně 50 kapek

Děti od 7 do 12 let 3 x denně 25 kapek

Děti od 2 do 7 let 3 x denně 10-15 kapek

Dospělí mohou přípravek používat neředěný, dětem se podává se lžící čaje.

Doporučuje se podávat přípravek ještě několik dní po vymizení příznaků onemocnění.

Upozornění

Přípravek je určen pro krátkodobé podávání, přičemž celková doba léčby by neměla být delší než 14 dní. Je třeba se vyvarovat výrazného překračování doporučených dávek.

Tento léčivý přípravek obsahuje 23,9 % obj. alkoholu, tj. do 426 mg v jedné dávce (50 kapek pro dospělého), což odpovídá do 10,5 ml piva (5 %), 4,4 ml vína (12 %). Tuto skutečnost je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen.

Může dojít ke vzniku slabého zákalu nebo snadno roztřepatelného mírného sedimentu, který však nesnižuje léčebný účinek přípravku.

Uchovávání

Při teplotě do 25°C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

V neporušeném obalu je doba použitelnosti přípravku 2 roky.

Po prvním otevření lahvičky je přípravek použitelný 3 měsíce.

Varování

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Balení

100 ml