

sp.zn. sukls21393/2010  
a sp.zn. sukls6362/2017

**Příbalová informace: informace pro pacienta**  
**Neo-angin třešeň 1,2 mg/0,6 mg/ 5,9 mg pastilky**

alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 – 4 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

**Co naleznete v této příbalové informaci:**

1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat.
3. Jak se Neo-angin třešeň používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Neo-angin třešeň uchovávat
6. Obsah balení a další informace

**1. Co je Neo-angin třešeň a k čemu se používá**

Neo-angin třešeň má antiseptické účinky a mírně působí proti bolesti.

Dospělí, dospívající a děti od 6 let mohou přípravek Neo-angin třešeň používat k podpůrné léčbě zánětlivých onemocnění dutiny ústní a hltanu, doprovázených typickými příznaky, jako jsou bolest v krku, zarudnutí v krku či mírné potíže při polykání.

**2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Neo-angin třešeň používat**

**Neužívejte Neo-angin třešeň**

- jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- Nepodávejte dětem do 6 let.

**Upozornění a opatření**

Před použitím přípravku Neo-angin třešeň se poradte s lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Neo-angin bez cukru nemá být používán bezprostředně před jídlem a pitím.

Používání tohoto přípravku po dobu delší než 5 dnů se nedoporučuje, protože může změnit bakteriální rovnováhu v dutině ústní.

Tento přípravek se nemá používat v případě větších akutních ran v oblasti dutiny ústní a krku.

### **Děti**

Přípravek Neo-angin třešeň nepodávejte dětem do 6 let. Léčba přípravkem Neo-angin třešeň u dětí vyžaduje, aby dítě bylo schopno postupně nechat pastilku rozpustit v ústech.

### **Další léčivé přípravky a přípravek Neo-angin třešeň**

Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky není známo.

### **Těhotenství a kojení**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat

#### *Těhotenství*

Vzhledem k nedostatečným zkušenostem s použitím v době těhotenství se použití přípravku Neo-angin bez cukru nedoporučuje bez předchozí porady s lékařem.

#### *Kojení*

Přípravek Neo-angin bez cukru může být při kojení předepisován pouze po pečlivém uvážení.

### **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Nebyl prokázán žádný vliv přípravku na řízení a obsluhu strojů.

### **Přípravek Neo-angin bez cukru obsahuje barvivo ponceau 4R (E124), butylhydroxyanisol (E320), benzylalkohol a isomalt (E953)**

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje barvivo Ponceau 4R, které může způsobit alergické reakce.

Přípravek obsahuje 1,05 mg benzylalkoholu v jedné pastilce, který může způsobit alergické reakce.

Tento léčivý přípravek také obsahuje butylhydroxyanisol (E320), který může způsobit podráždění sliznic.

#### Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje isomalt.

Jestliže vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento léčivý přípravek používat.

Přípravek Neo-angin třešeň obsahuje také 2,58 g isomaltu, což odpovídá 6 kcal (26 kJ v jedné pastilce). Pomocná látka isomalt může mít při denních dávkách vyšších než 10 g mírně projímavý účinek

### **3. Jak se Neo-angin třešeň používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Pokud lékař neurčí jinak, nechají si dospělí, dospívající a děti od 6 let pomalu rozpustit v ústech každé 2-3 hodiny 1 pastilku. Denně je možné použít maximálně 6 pastilek.

### **Délka léčby**

Poradte se se svým lékařem, jestliže se příznaky zhorší a nebo nedojde k jejich zlepšení do 3 - 4 dnů. Celková délka léčby tímto přípravkem je nejvýše 5 dní.

### **Jestliže jste použil(a) více přípravku Neo-angin třešeň než jste měl(a)**

Žádné případy předávkování nebyly dosud popsány. Ve velmi nepravděpodobném případě předávkování se mohou v zesílené míře vyskytnout popsané nežádoucí účinky. V takovém případě se doporučuje léčba příznaků.

### **Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Neo-angin třešeň**

Jestliže jste zapomněl(a) užít Neo-angin třešeň, nezdvoujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte dále v užívání tak, jak je předepsáno.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

## **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Neo-angin třešeň nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na následující četnosti výskytu:

Velmi časté:	více než 1 z 10 pacientů
Časté:	méně než 1 z 10 pacientů, ale více než 1 z 100 pacientů
Méně časté:	méně než 1 z 100 pacientů, ale více než 1 z 1000 pacientů
Vzácné:	méně než 1 z 1000 pacientů, ale více než 1 z 10000 pacientů
Velmi vzácné:	méně než 1 z 10000 pacientů, není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Není známo:	z dostupných údajů nelze určit

Velmi vzácné:

- podráždění ústní a žaludeční sliznice, jako např. poruchy trávení, pocit na zvracení

Není známo:

- alergické reakce jako např. otok úst, jazyka a rtů, vyrážka,
- dušnost a kašel

### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## **5. Jak přípravek Neo-angin třešeň uchovávat**

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## **6. Obsah balení a další informace**

### **Co přípravek Neo-angin třešeň obsahuje:**

Léčivými látkami jsou alcohol dichlorobenzylicus, amylmetacresolum, levomentholum. Jedna pastilka obsahuje alcohol dichlorobenzylicus 1,2 mg, amylmetacresolum 0,6 mg, levomentholum 5,9 mg.

Pomocnými látkami jsou isomalt, kyselina vinná, třešňové aroma obsahující mimo jiné benzylalkohol a butylovaný hydroxyanisol (E320), sílice máty peprné, Ponceau 4R, indigokarmín.

### **Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení**

**Přípravek Neo-angin třešeň jsou červené ploché, mírně průsvitné, kulaté pastilky.**

Balení obsahuje 24 a 48 pastilek v průhledném PVC/PVDC/A1 blistru v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce**

Divapharma GmbH  
Motzener Strasse 41  
12277 Berlin  
Německo

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 7. 2017**