

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS Roztok ve spreji

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SinexVicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml, nosní sprej, roztok

oxymetazolinhydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však SinexVicks Aloe a Eukalyptus musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 3 dnů, musíte se poradit s lékařem.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:

1. Co je SinexVicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete SinexVicks Aloe a Eukalyptus používat
3. Jak se SinexVicks Aloe a Eukalyptus používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak SinexVicks Aloe a Eukalyptus uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

SinexVicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s rýmou nebo zánětem nosních dutin. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává 6-8 hodin.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek SinexVicks Aloe a Eukalyptus:

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus (viz sekce 6).

jestliže užíváte (nebo jste užíval/a během minulých 2 týdnů) inhibitory monoaminoxidázy

(užívají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo depresí).

jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem.

jestliže trpíte zvýšením nitroočního tlaku (zelený zákal s úzkým úhlem).

jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový).

jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky.

Nepodávejte dětem do 6 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus je zapotřebí

Před zahájením léčby přípravkem SinexVicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem, pokud máte:

vysoký krevní tlak,

onemocnění srdce,

2/4

diabetes (cukrovku),

poruchu funkce štítné žlázy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Prosím, než začnete SinexVicks Aloe a Eukalyptus užívat, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu:

inhibitory monoaminoxidázy, které se užívají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese.

Nepoužívejte SinexVicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval/a tyto léky během minulých 2 týdnů.

tricyklická antidepresiva informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin.

léky proti vysokému krevnímu tlaku- informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte bethanidin, debrisochin a guanethidin, protože jejich účinek se může snížit.

lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) léčba přípravkem SinexVicks Aloe a Eukalyptus může být ovlivněna, pokud se tyto léky užívají současně.

Těhotenství a kojení

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat SinexVicks Aloe a Eukalyptus.

Během těhotenství a kojení je třeba opatrnosti při používání přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyl zaznamenán žádný vliv na řízení nebo obsluhu strojů.

Důležité informace o některých složkách přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus

Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS POUŽÍVÁ

Vždy používejte SinexVicks Aloe a Eukalyptus přesně podle pokynů svého lékárníka nebo lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: Doporučená dávka je:

Dospělí a děti starší 10 let: 1-2 vstříky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.

Děti 6-10 let: 1 vstřík do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně.

Děti do 6 let: nepoužívat

Nepřekračujte doporučenou dávku.

Nepoužívejte déle než 7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, SinexVicks Aloe a Eukalyptus může způsobit ucpaní nosu.

Zeptejte se svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo nezlepší po 3 dnech.

Návod:

1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete.
2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky.
3. Dospělí a děti nad 10 let mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba.
4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasadte kryt zpět.

Jestliže jste použil(a) více přípravku SinexVicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a)

Kontaktujte ihned svého lékaře nebo nemocnici a vezměte lék s sebou.

3/4

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek SinexVicks Aloe a Eukalyptus

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i SinexVicks Aloe a Eukalyptus nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (objevují se u méně než 1 ze 100 lidí):

Kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle.

Vzácné (objevují se u méně než 1 z 1000 lidí):

Úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku u dětí, zrychlení srdeční akce, bušení srdce, zvýšení krevního tlaku, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolesti hlavy, nevolnost, návaly, vyrážka, poruchy vidění.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí

Uchovávejte do 25°C.

Nepoužívejte SinexVicks Aloe a Eukalyptus po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za značkou EXP. Ukončení doby použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co SinexVicks Aloe a Eukalyptus obsahuje

Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml.

Pomocné látky jsou: Sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, tyloxapol, roztok chlorhexidin-diglukonátu, kyselina citrónová, suchý aloeový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrátdinatrium-edetátu, karvon, hydroxid sodný, čištěná voda (viz konec sekce 2 benzalkonium-chlorid)

Jak SinexVicks Aloe a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení

SinexVicks Aloe a Eukalyptus je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou.

Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 10 nebo 15 ml roztoku.