

## Příbalová informace: informace pro pacienta

### Strepsils Pomeranč s vitamínem C pastilky

amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, acidum ascorbicum, natrii ascorbas

**Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

#### Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Strepsils Pomeranč s vitamínem C a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitamínem C používat
3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitamínem C používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Strepsils Pomeranč s vitamínem C uchovávat
6. Obsah balení a další informace

#### 1. Co je Strepsils Pomeranč s vitamínem C a k čemu se používá

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitamínem C obsahují léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol, natrium-askorbát a kyselinu askorbovou, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitamínem C se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let.

#### 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitamínem C používat

##### Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitamínem C

- jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
- přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti.

## **Upozornění a opatření**

Před použitím Strepsils Pomeranč s vitamínem C se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Strepsils Pomeranč s vitamínem C je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 3 dny (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů).

Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře.

## **Děti**

Strepsils Pomeranč s vitamínem C není určen dětem do 6 let.

## **Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitamínem C**

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku.

## **Strepsils Pomeranč s vitamínem C s jídlem a pitím**

Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku.

## **Těhotenství, kojení a plodnost**

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje.

## **Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Strepsils Pomeranč s Vitamínem C nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

## **Strepsils Pomeranč s vitamínem C obsahuje glukosu a sacharosu**

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosu a 1,5 g sacharosu v jedné pastilce. Toto je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Tekutá glukosa obsahuje oxid siřičitý (E 220), který může vzácně způsobovat těžké alergické reakce a bronchospasmus (zúžení průdušek).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné pastilce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Tento léčivý přípravek obsahuje alergenní vonné látky citral, citronellol, d-limonen, geraniol a linalol (obsažené v pomerančovém aroma). Tyto látky mohou vyvolat alergickou reakci.

Tento léčivý přípravek obsahuje 3 mg propylenglykolu v jedné pastilce.

Tento léčivý přípravek obsahuje jen velmi malé množství lepku (glutenu; z pšeničného škrobu obsaženého v tekuté glukose). Je považován za „bezlepkový“ a je velmi nepravděpodobné, že by způsobil problémy, pokud máte celiakii. Jedna pastilka neobsahuje více než 19,38 mikrogramů lepku

(glutenu). Pokud máte alergii na pšenici (odlišnou od celiakie), neměl(a) byste tento léčivý přípravek používat.

### **3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitamínem C používá**

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitamínem C jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let.

Doporučené dávkování přípravku je:

Dospělí: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.  
Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin.

Dospívající a děti od 6 let: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku.  
Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin.

Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná.

Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 3 dny.

#### **Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitamínem C, než jste měl(a)**

Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

### **4. Možné nežádoucí účinky**

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností:

#### **Není známo (z dostupných údajů nelze určit)**

- reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, angioedém (otok obličeje, rtů, hrdla nebo jazyka a potíže s dýcháním nebo polykáním), kopřivka, bronchospasmy (stahy průdušek), snížený krevní tlak, který může způsobit mdloby, horečka, průjem;
- vyrážka;
- bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech.

#### **Hlášení nežádoucích účinků**

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: [www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek](http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek)

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

## 5. Jak Strepsils Pomeranč s vitamínem C uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

## 6. Obsah balení a další informace

### Co Strepsils Pomeranč s vitamínem C obsahuje

Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, acidum ascorbicum, natrii ascorbas. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, acidum ascorbicum 33,5 mg, natrii ascorbas 74,9 mg.

Pomocné látky: levomenthol, pomerančové aroma (obsahuje citral, citronellol, d-limonen, geraniol a linalol), propylenglykol, kyselina vinná, tekutá glukosa usušená rozprášením (z pšeničného škrobu), tekutá sacharóza.

### Jak Strepsils Pomeranč s vitamínem C vypadá a co obsahuje toto balení

Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky kyselé, pomerančové a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky.

Blistr: PVC/PVdC/Al, krabička.

Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

### Držitel rozhodnutí o registraci

Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika

### Výrobce

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko

**Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 12. 2021.**